

Matagami, le 15 septembre 2025

AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE LA
3^E ANNÉE DU SECONDAIRE

Objet : Programme de vaccination en milieu scolaire

Cher parent,

Dans le cadre du programme de vaccination en milieu scolaire, certains vaccins sont offerts gratuitement aux élèves de la 3^e année du secondaire. Au Québec, l'âge légal pour le consentement à la vaccination et aux autres soins est de 14 ans. Votre enfant est donc en mesure de consentir lui-même.

Vous trouverez ci-dessous des informations pour le soutenir dans sa démarche de consentement. Pour plus d'informations sur la vaccination et les maladies évitables par la vaccination, vous pouvez aussi consulter : [Québec.ca/vaccination](https://quebec.ca/vaccination).

VACCINS À RECEVOIR

La vaccination à l'école secondaire le Delta aura lieu le **26 septembre 2025**.

Le jour de la vaccination, assurez-vous que votre enfant a son carnet de vaccination en main. Les vaccins administrés y seront inscrits. Il pourra être vacciné contre la diphtérie et le tétanos, ainsi que contre le méningocoque et l'hépatite B. La carte d'assurance maladie n'est pas requise

Vaccin contre la diphtérie et le tétanos

La vaccination contre la diphtérie et le tétanos est recommandée aux jeunes en 3^e année du secondaire. Le vaccin combiné contre la diphtérie et le tétanos et le vaccin combiné contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos (vaccin dcaT) peuvent être utilisés. Il est sécuritaire de recevoir le vaccin dcaT, même si la composante contre la coqueluche n'est pas nécessaire. Les réactions possibles après la vaccination sont les mêmes pour les deux vaccins. Puisque la diphtérie et le tétanos sont des maladies très sérieuses, les nourrissons reçoivent un vaccin dès l'âge de deux mois contre ces maladies, mais pour conserver la protection, une dose est offerte à votre enfant en 3^e secondaire.

Vaccination contre le méningocoque

Le méningocoque est une bactérie qui peut causer des infections graves, telles qu'une méningite et une infection du sang (septicémie). Une dose de vaccin contre le méningocoque est administrée aux nourrissons. Toutefois, comme l'adolescence est une période à risque pour la méningite, les experts québécois recommandent l'administration d'une dose supplémentaire en 3^e année du secondaire.

...verso

Vaccination contre l'hépatite B

L'hépatite B est une infection du foie causée par un virus et pouvant entraîner des complications comme une infection permanente du foie. Une dose de vaccin contre l'hépatite B en utilisant le vaccin combiné contre l'hépatite A et l'hépatite B a été administrée en 4^e année du primaire. La 2^e dose de vaccin contre l'hépatite B est prévue en 3^e secondaire.

Mise à jour du carnet de vaccination

Au moment de vacciner votre enfant, l'infirmière consultera son dossier et son carnet de vaccination afin de vérifier si sa vaccination est à jour pour l'ensemble de ces maladies : la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole, la rubéole, les oreillons, les infections à méningocoque, la varicelle, l'hépatite A, l'hépatite B et les infections par les virus du papillome humain (VPH). Si la vaccination de votre enfant n'est pas à jour, l'infirmière pourra alors lui proposer les vaccins manquants. Si des doses additionnelles sont nécessaires, elles seront offertes à l'école en cours d'année au moment sera déterminé par l'infirmière scolaire.

Votre enfant a reçu une dose de vaccin contre les VPH en 4^e année du primaire et la deuxième dose devait être offerte en 3^e année du secondaire. Toutefois, les experts québécois recommandent maintenant un calendrier à une seule dose de vaccin contre les VPH. Ce calendrier offre une protection élevée et similaire à celle induite par un calendrier à deux doses. La deuxième dose prévue en 3^e année du secondaire n'est donc plus requise. Toutefois, si votre enfant n'a pas déjà reçu une dose, il pourra la recevoir cette année.

Il n'y a aucun risque à recevoir plusieurs vaccins lors d'une même séance de vaccination. Cette pratique est sécuritaire et répandue dans le monde entier. Il est important de recevoir toutes les doses requises pour avoir une bonne protection.

Votre enfant recevra des feuillets d'information sur les possibles réactions que peuvent causer les vaccins et sur les moyens à prendre pour les soulager. Ces réactions peuvent apparaître dans les 24 à 72 heures suivant l'administration des vaccins et sont de courte durée.

Nous vous remercions de votre collaboration et de votre contribution à la promotion de la santé des jeunes du Québec.

Myriam Cuillerier
Infirmière clinicienne en santé scolaire